

Syphilis infectieuse

Le taux de déclaration de la syphilis infectieuse s'est maintenu à de faibles taux pendant plusieurs années avant 2002, année où les taux ont commencé à augmenter en raison d'éclosions dans plusieurs provinces ou territoires. Au cours des dernières années, des taux continuellement élevés de cas déclarés de syphilis infectieuses ont été documentés dans diverses régions du Canada, concentrés principalement dans les grands centres urbains, ce qui donne à penser que la syphilis devient endémique à nouveau dans une grande partie du pays. De nombreuses provinces et certains territoires ont signalé des éclosions récentes ou actuelles de syphilis infectieuse.

Les éclosions sont souvent associées aux déplacements entre provinces et territoires ou à l'extérieur du pays. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes constituent l'un des groupes les plus affectés, mais des éclosions se sont également manifestées chez des hommes et des femmes hétérosexuels, créant une augmentation des cas de syphilis congénitale chez les petits enfants. L'injection de drogues et le commerce du sexe sont des facteurs en cause dans certaines provinces et certains territoires. Parmi les mesures prises par les responsables de la santé publique devant l'augmentation des cas de syphilis infectieuse, mentionnons la sensibilisation des fournisseurs de soins de santé, l'augmentation des tests, les campagnes d'éducation sur Internet visant la population générale et les blitz de tests chez les populations les plus affectées. En 2016, 3 829 cas de syphilis infectieuse ont été déclarés au Canada, ce qui représente un taux de 10,6 pour 100 000 habitants.